

测试报告

样品信息			
样品名称	刺五加	项目编号	JH20231116-03
样品批号	\	样品性状	\
收样日期	2023/11/16	测试期间	2023/12/08-12/09
标样信息			
名称	规格	数量	
紫丁香苷	mg	20	
实验要求			
理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于 2000			
参考方法			
中国药典 2020 版一部			
试剂信息			
试剂名称	级别	品牌	
甲醇	HPLC	月旭	
仪器信息			
仪器厂家	仪器型号		
岛津	岛津 LC-20AD		

1. 试验过程

1.1. 色谱条件

色谱柱	月旭 Ultimate [®] Alk C18 (4.6×250mm, 5μm)
流动相	甲醇/水=20/80
柱温	30℃
检测波长	265nm
流速	1.0ml/min
进样量	10ul
注意事项	20 ul 进样量下会有溶剂效应

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾(中山)科技园紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路 22 号 F 栋 4 楼

Tel: 400-810-6969

第 1 页 共 3 页

邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500



1.2. 溶液配制

1.2.1. 流动相配制

甲醇: 取色谱级甲醇, 超声脱气, 即得;


1.2.2. 样品溶液配制

1.2.2.1 对照品溶液: 取紫丁香苷对照品适量, 精密称定, 加甲醇制成每 1ml 含 80 μ g 的溶液, 即得。

1.2.2.2 供试品溶液: 称取本品粗粉 2g, 置具塞锥形瓶中, 精密加入甲醇 25ml, 称定重量, 超声处理 (功率 250W, 频率 33kHz) 30 分钟, 放冷, 摇匀, 滤过, 取续滤液, 即得。

2. 谱图和数据

2.1 对照品溶液检测谱图



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	13.704	2301337	96499	7473	1.005	--

声明: 除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add: 上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾 (中山) 科技园紫荆园 10 号楼

Add: 浙江省金华市婺城区双林南街 168 号

Add: 江苏省南京市六合区天圣路 22 号 F 栋 4 楼

Tel: 400-810-6969

第 2 页 共 3 页


邮编: 201600

邮编: 321000

邮编: 211500



2.2 供试品溶液检测谱图



峰号	保留时间	面积	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	13.817	362769	14968	7464	0.963	--

3. 结论

使用月旭 Ultimate® Alk C18 (4.6×250mm, 5um) 色谱柱, 在此色谱条件下, 能满足检测要求;

报告人: Manle

审核人: Wu XM

日期: 2023/12/12

